

HEPATITIS B. PROFILAXIS POSTEXPOSICIÓN PERMUCOSA O PERCUTÁNEA AL VHB

PROFILAXIS POSTEXPOSICIÓN EXTRALABORAL PERMUCOSA O PERCUTÁNEA AL VHB

| Estado vacunal de la persona expuesta | Fuente HbsAg + | Fuente desconocida* |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|
| No vacunados | <i>IGHB antes de las 24 horas e iniciar vacunación</i> | <i>Iniciar vacunación</i> |
| Personas en proceso de vacunación o con pauta incompleta | <i>Administrar IGHB y completar pauta de vacunación</i> | <i>Completar vacunación</i> |
| Vacunados con certificado de vacunación y respuesta desconocida | <i>Administrar dosis de recuerdo</i> | <i>No precisa actuación</i> |

Dosis de IGHB (inmunoglobulina específica de hepatitis B): = 0,06 ml/kg intramuscular, preferentemente antes de las 24 horas. Período máximo: antes de 7 días en exposiciones percutáneas y 14 días en contactos sexuales.

Vacuna de la hepatitis B: Se debe de administrar lo antes posible y antes de 8 días.

* La CDC, en caso de que la fuente sea desconocida o no esté disponible recomiendan administrar solamente la vacuna.

PROFILAXIS POSTEXPOSICIÓN OCUPACIONAL PERMUCOSA O PERCUTÁNEA AL VHB

| Estado vacunal de la persona expuesta | Fuente HbsAg + | Fuente HbsAg - | Fuente desconocida |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No vacunado previamente | <i>1ª dosis de IGHB* e iniciar vacunación</i> | <i>Iniciar vacunación</i> | <i>Iniciar vacunación</i> |
| Vacunado previamente respondedor** | <i>No precisa actuación</i> | <i>No precisa actuación</i> | <i>No precisa actuación</i> |
| Vacunado previamente no respondedor | <i>1ª dosis de IGHB* e reiniciar vacunación ó 2 dosis de IGHB*</i> | <i>No precisa actuación</i> | <i>1ª dosis de IGHB* e reiniciar vacunación ó 2 dosis de IGHB*</i> |
| Vacunado previamente respuesta desconocida | <i>Determinar el título de anti-Hbs: Niveles adecuados: No precisa actuación Niveles inadecuados: Iniciar vacunación</i> | <i>No precisa actuación</i> | <i>Determinar el título de anti-Hbs: Niveles adecuados: No precisa actuación Niveles inadecuados: Iniciar vacunación</i> |



Documentos www.1aria.com

Hepatitis B. Profilaxis postexposición permucosa o percutánea al VHB

* Dosis de IGHB: = 0,06 ml/kg intramuscular. Se debe de administrar preferentemente dentro de las 24 horas postexposición. No está demostrado su efecto después de 7 días postexposición.