

Sintrom® . Suspensión temporal del tratamiento con Sintrom® (Acecumarol). Documentación para el paciente

	DÍA		
2 DÍAS ANTES DE LA INTERVENCIÓN		1 vial subcutáneo por la mañana	NO TOMAR SINTRON®
1 DÍA ANTES		1 vial subcutáneo por la mañana	NO TOMAR SINTRON®
EL DÍA DE LA CIRUGÍA		1 vial subcutáneo por la mañana	SINTRON® POR LA NOCHE, DOSIS HABITUAL
AL DÍA SIGUIENTE		1 vial subcutáneo por la mañana	SINTRON® POR LA NOCHE, DOSIS HABITUAL
2 DÍAS DESPUÉS		1 vial subcutáneo por la mañana	SINTRON® POR LA NOCHE, DOSIS HABITUAL
3 DÍAS DESPUÉS		NO PONER	SINTRON® EN SU HORARIO Y DOSIS HABITUAL

Aviso a pacientes y familiares

La información recogida en esta página web está dirigida, únicamente, a profesionales sanitarios de la atención primaria. No deberá utilizar su información para diagnosticar o tratar ninguna enfermedad o problema de salud. Si presenta o duda sobre existencia de un problema de salud deberá contrastar esta información con su médico de cabecera. *Actualizado Junio de 2012*