

**TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL ANTE DISTINTAS SITUACIONES CLÍNICAS:**

<b>SITUACIÓN CLÍNICA</b>	<b>GRUPOS FARMACOLÓGICOS</b>
<b>Ictus previo</b>	<i>Diuréticos, Betabloqueantes, Calcioantagonistas, IECA, ARA II.</i>
<b>Infarto de miocardio previo</b>	<i>Betabloqueantes, IECA, ARA II.</i>
<b>Angor</b>	<i>Betabloqueantes, Calcioantagonistas.</i>
<b>Insuficiencia cardiaca</b>	<i>Diuréticos, Betabloqueantes, Calcioantagonistas, IECA, ARA II, antialdosteronicos</i>
<b>FA recurrente</b>	<i>ARAII, IECA.</i>
<b>FA permanente</b>	<i>Betabloqueantes, calcioantagonistas (no dihidropiridínicos).</i>
<b>Fallo renal/proteinuria</b>	<i>IECA, ARA II, Diuréticos de asa</i>
<b>Arteriopatía periférica</b>	<i>Calcioantagonistas</i>
<b>HTA sitólica aislada (ancianos)</b>	<i>Diuréticos, calcioantagonistas.</i>
<b>Síndrome metabólico</b>	<i>IECA, ARA II, Calcioantagonista</i>
<b>Diabetes mellitus</b>	<i>IECA, ARA II</i>
<b>Embarazo</b>	<i>Calcioantagonistas, metildopa, betabloqueantes</i>
<b>Etnia negra</b>	<i>Diuréticos, Calcioantagonistas.</i>
<b>Glaucoma</b>	<i>Betabloqueantes</i>