

INDICACIONES DE INSULINIZACIÓN EN PACIENTES CON DIABETES TIPO 2

- 1.- Fracaso del tratamiento con antidiabéticos orales (HbA1c > 7%), a pesar de estar combinados en dosis plenas
- 2.- Descompensaciones hiperglucémicas agudas:
 - ✓ *Cetoacidosis,*
 - ✓ *Complicación hiperosmolar*
- 3.- Enfermedades intercurrentes:
 - ✓ *Sepsis,*
 - ✓ *Infarto agudo de miocardio,*
 - ✓ *Cirugía mayor,*
 - ✓ *Traumatismo grave,*
 - ✓ *Intolerancia oral,*
 - ✓ *Insuficiencia cardíaca,*
 - ✓ *Insuficiencia hepática o*
 - ✓ *Insuficiencia renal aguda*
- 4.- Embarazo
- 5.- Pérdida de peso no explicable por dieta hipocalórica o cetonuria intensa

Modificado de Insulinoterapia en Atención Primaria. Llanes de Torres R. AMF 2011

Aviso a pacientes y familiares

La información recogida en esta página web está dirigida, únicamente, a profesionales sanitarios de la atención primaria. No deberá utilizar su información para diagnosticar o tratar ninguna enfermedad o problema de salud. Si presenta o duda sobre existencia de un problema de salud deberá contrastar esta información con su médico de cabecera.