

REGÍMENES ANTIBIOTICOS PARA LA PROFILAXIS DE LA ENDOCARDITIS		
<i>Profilaxis oral estándar</i>	<i>Amoxicilina</i>	<i>Adultos: 2g (niños 50 mg/kg), dosis única 30 a 60 minutos antes del procedimiento</i>
<i>Incapaces para medicación oral</i>	<i>Ampicilina ó</i>	<i>Adultos: 2g IM ó IV (niños 50 mg/kg IM ó IV), dosis única 30 a 60 minutos antes del procedimiento</i>
	<i>Cefazolina ó ceftriaxona</i>	<i>Adultos: 1g IM ó IV (niños 50 mg/kg IM ó IV), dosis única 30 a 60 minutos antes del procedimiento</i>
<i>Alérgicos a la penicilina (Profilaxis oral)</i>	<i>Cefalexina ** ó</i>	<i>Adultos: 2g (niños 50 mg/kg), dosis única 30 a 60 minutos antes del procedimiento</i>
	<i>Clindamicina ó</i>	<i>Adultos: 600 mg (niños 20 mg/kg), dosis única 30 a 60 minutos antes del procedimiento.</i>
	<i>Azitromicina ó claritromicina</i>	<i>Adultos: 500 mg (niños 15 mg/kg), dosis única 30 a 60 minutos antes del procedimiento</i>
<i>Alérgicos a la penicilina (Incapaces para medicación oral)</i>	<i>Cefazolina ó ceftriaxona +</i>	<i>Adultos: 1g IM ó IV (niños 50 mg/kg IM ó IV), dosis única 30 a 60 minutos antes del procedimiento.</i>
	<i>Clindamicina</i>	<i>Adultos: 1g IM ó IV (niños 50 mg/kg IM ó IV), dosis única 30 a 60 minutos antes del procedimiento.</i>

IM ó IV Intramuscular o intravenosa

** O usar otra cefalosporina de primera o segunda generación oral en dosis equivalentes para niño o adulto.*

+ Las cefalosporinas no pueden ser usadas em pacientes com historia de anafilaxis, angioedema o urticária con penicilinas o ampicilina

Basado en los protocolos del Servicio de Cardiología de Complejo Hospitalario de A Coruña.

Aviso a pacientes y familiares

La información recogida en esta página web está dirigida, únicamente, a profesionales sanitarios de la atención primaria. No deberá utilizar su información para diagnosticar o tratar ninguna enfermedad o problema de salud. Si presenta o duda sobre existencia de un problema de salud deberá contrastar esta información con su médico de cabecera.