

CAMPAÑA DE VACUNACIÓN ANTIGRI PAL 2017

¿QUIÉN DEBE VACUNARSE?

PERSONAS CON RIESGO DE COMPLICACIONES

Personas de 60 o más años, realizando especial hincapié en la vacunación de las personas de 65 o más años.

Personas de cualquier edad residentes en instituciones cerradas (residencias de personas mayores y otros centros de atención a crónicos).

Mujeres embarazadas en cualquier trimestre de la gestación.

Niños y adolescentes (de 6 meses a 18 años) con tratamientos prolongados de ácido acetilsalicílico, por la posibilidad de desarrollar un síndrome de Reye.

Personas menores de 60 años y mayores de 6 meses con alguna de las siguientes patologías que presentan un mayor riesgo de padecer complicaciones derivadas de la gripe:

- Enfermedades del sistema cardiovascular.
- Enfermedades respiratorias (incluye asma, displasia broncopulmonar, fibrosis cística...).
- Enfermedades neurológicas, neuromusculares u otros trastornos que dificulten la movilización de secreciones o aumenten el riesgo de aspiración.
- Enfermedades metabólicas (incluye diabetes mellitus).
- Enfermedades renales.
- Enfermedades hepáticas.
- Asplenia o disfunción esplénica.
- Hemoglobinopatías y anemias.
- Pacientes con cáncer e inmunosupresión (incluida la causada por el VIH, medicación, receptores de trasplantes...).
- Trastornos y enfermedades que implican disfunción cognitiva (síndrome de Down, parálisis cerebral, demencias...).
- Personas con obesidad mórbida (índice de masa corporal ≥ 40 en adultos, ≥ 35 en adolescentes o ≥ 3 DS en la infancia).
- Personas portadoras de implantes cocleares o en espera.

En estos grupos se hará un especial hincapié en aquellas personas que precisan seguimiento médico periódico o aquellas hospitalizadas en el año previo.

PERSONAS QUE LES PUEDEN TRANSMITIR LA GRIPE A PERSONAS CON ALTO RIESGO DE PRESENTAR COMPLICACIONES

Todos los trabajadores de centros sanitarios, servicios y establecimientos sanitarios, tanto de atención primaria como de especializada, públicos o privados, con especial hincapié en aquellos que atienden pacientes de alto riesgo.

Estudiantes en prácticas en centros sanitarios.

Personas que trabajan en instituciones cerradas, o en centros de atención a enfermos crónicos especialmente las que tengan contacto continuo con personas vulnerables.

Personas que proporcionan cuidados domiciliarios a pacientes de alto riesgo o a personas mayores.

Miembros de la familia y convivientes (incluidos niños) de personas pertenecientes a grupos de riesgo.

OTRAS PERSONAS EN LAS CUALES SE RECOMIENDA LA VACUNACIÓN

Personas que desarrollan trabajos esenciales para la comunidad: fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, bomberos, personal de protección civil, emergencias sanitarias, trabajadores de instituciones penitenciarias...

Trabajadores expuestos directamente a las aves o cerdos en las granjas o explotaciones avícolas o porcinas y también a las aves silvestres. La finalidad es reducir la oportunidad de una infección concomitante de virus humano y aviar o porcino, disminuyendo la posibilidad de recombinación o intercambio genético entre ambos virus.