

CALENDARIO VACUNAL DEL ADULTO DEL PROGRAMA GALLEGO DE VACUNACIÓN 2018.

Corrección del 11 de mayo de 2018

Documento en PDF

VACUNAS/EDAD	Hasta los 35 años	36-49 años	50-59 años	60 o más años
Td (Tétanos-difteria)	Completar o iniciar pauta de vacunación (5 dosis) Si tiene el calendario infantil completo: 1 dosis de recuerdo a los 65 años			
dTpa ⁽²⁾ (Difteria, Tétanos y tosferina)	Embarazadas (semana 28-36, preferible en al 3 ^o): 1 dosis cada embarazo			
GRIPE	Si existe factor de riesgo: 1 dosis anual			1 dosis anual
NEUMOCÓCICA CONJUGADA	Si existe factor de riesgo: 1 dosis			1 dosis al cumplir 65 años
NEUMOCÓCICA DE POLISACÁRIDOS 23V	Si existe factor de riesgo: 1 dosis (intervalo mínimo 1 año después de la PnC13)			1 dosis a los 66 años ⁽¹⁾
HEPATITIS B	Si no fueron vacunados previamente: 3 dosis	Nacidos antes de 1982, si existe factor de riesgo: 3 dosis		
TRIPLE VÍRICA ⁽³⁾ (Sarampión, Rubeola y parotiditis)	Si no fueron vacunados previamente y nacieron después de 1981: 2 dosis Si no cumplen criterios de inmunidad y nacieron entre 1968 y 1981: 1 dosis			
VARICELA ⁽⁴⁾	Si no fueron criterios de inmunidad: 2 dosis			
MENINGOCOCO C	Si no fueron vacunados previamente: 1 dosis	Si existe factor de riesgo: 1 dosis		
VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO: VPH ⁽⁵⁾	Mujeres, nacidas a partir de 1994, si no fueron vacunadas previamente: 3 dosis	Si existe factor de riesgo: 3 dosis		

	Para todas las personas de la categoría y de las edades indicadas para las que no haya constancia de inmunización/ inmunidad
	Recomendada si existe otro factor de riesgo
	No indicada

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1.- Neumocócica de polisacáridos 23 v: Personas de 66 años o más no vacunadas con anterioridad 2.- dTpa: Personal sanitario de las áreas de obstetricia y pediatría: 1 dosis 3.- Triple vírica: 2 dosis para sanitarios, trabajadores de centros educativos y viajeros a zonas de alto riesgo 4.- Varicela: Según las fichas técnicas de las vacunas frente a la varicela no existen datos de eficacia protectora ni de respuesta inmune en las personas seronegativas mayores de 65 años 5.- VPH: Mujeres sometidas a tratamiento excisional de CIN 2+ o AIS en los 6 últimos meses: 3 dosis |
|---|