

VACUNAS. CALENDARIO VACUNAL PARA LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA 2012

El Comité asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría aprobó el calendario de vacunaciones recomendado para España en el 2012, que puede ser modificado por cada una de la CCAA.

Vacunas	0m	2m	4m	6m	12-15m	15-18m	2-3 años	4-6 años	11-14 años
Hepatitis B ¹	HB	HB	HB	HB					
Difteria, tétanos y tos ferina ²		DTPa	DTPa	DTPa		DTPa		Tdpa	Tdpa
Poliomielitis ³		VPI	VPI	VPI		VPI			
Haemophilus influenzae B ⁴		Hib	Hib	Hib		Hib			
Meningococo C ⁵		MenC	MenC	MenC					
Neumococo ⁶		VNC	VNC	VNC					
Sarampión, Parotiditis, Rubéola ⁷					SRP		SRP		
Virus del papiloma humano ⁸									VPH 3 dosis
Rotavirus ⁹		RV – 2 ó 3 dosis							
Varicela ¹⁰					Var		Var		
Gripe ¹¹					Gripe				
Hepatitis A ¹²					HA – 2 dosis				

	Sistemática		Recomendable		Grupos de riesgo
--	-------------	--	--------------	--	------------------

1.- Vacuna antihepatitis B (HB).- 3 dosis según dos pautas equivalentes: 0,1, 6 meses o 0, 2, 6 m o 2, 4, 6 m, todas adecuadas para hijos de madres seronegativas (HBsAg negativa), siendo las dos primeras pautas también adecuadas para los niños deportadoras del virus de la hepatitis B (HBsAg +) Estos últimos recién nacidos (madres HBsAg +) recibirán en las primeras 12 h de vida la 1ª dosis de vacuna y 0,5 ml de inmunoglobulina antihepatitis B, la segunda dosis de vacuna a la edad de 1 ó 2 meses y la tercera dosis a los 6 m. Si la serología materna es desconocida debe administrarse la 1ª dosis de vacuna en las primeras 12 horas de vida e investigar la serología inmediatamente y, si resultara positiva, administrar 0,5 ml de inmunoglobulina antihepatitis B en la primera semana de vida (preferentemente en las primeras 72 horas de vida). La administración de 4 dosis de vacuna HB es aceptable si se emplea la vacuna combinada hexavalente a los 2, 4 y 6 meses de edad en niños vacunados de la primera dosis al nacer. Los niños y adolescentes no vacunados según las pautas anteriores recibirán a cualquier edad 3 dosis según la pauta 0, 1, 6 meses.

2.- Vacuna frente a difteria, tétanos y tos ferina acelular (DTPa/Tdpa).- 6 dosis: primovacuna con 3 dosis de vacuna DTPa; refuerzo a los 15-18 m (cuarta dosis), 4-6 años (quinta dosis) con DTPa y a los 14-16 años (sexta dosis) con el preparado para adultos de baja carga antigénica de difteria y tos ferina (Tdpa).

3.- Vacuna antipoliomielitis inactivada (VPI).- 4 dosis: primovacuna con 3 dosis y refuerzo a los 15-18 m (cuarta dosis).

4.- Vacuna conjugada frente a Haemophilus influenzae tipo b (Hib).- 4 dosis: primovacuna a los 2, 4, 6 m y refuerzo a los 15-18 m (cuarta dosis).

5.- Vacuna conjugada frente a meningococo C (MenC).- 3 dosis: la primera a los 2 m, la segunda a los 4 ó 6 m y la tercera entre los 12 y 15 m de edad.

6.- Vacuna conjugada frente a neumococo (VNC).- 4 dosis: las tres primeras a los 2, 4, 6 m con un refuerzo entre los 12 y 15 meses de edad (cuarta dosis).

7.- Vacuna frente a sarampión, rubeola y parotiditis (SRP).- 2 dosis de vacuna sarampión-rubeola-parotiditis (triple vírica). La primera a los 12-15 m y la segunda a los 2-3 años de edad (preferentemente a los 2 años).

8.- Vacuna frente al virus del papiloma humano (VPH).- Solo para niñas. 3 dosis entre 11-14 años. Pauta vacunal según preparado comercial: Gardasil^R pauta 0, 2, 6 m y Cervarix^R pauta 0, 1, 6 m.

9.- Vacuna antirrotavirus (RV).- 2 ó 3 dosis de vacuna frente a rotavirus según el preparado comercial: Rotarix^R, si está disponible, 2 dosis a los 2, 4 m y RotaTeq^R 3 dosis a los 2, 4, 6 m o a los 2, 3, 4 m. La pauta debe completarse antes de la edad de 24 o 26 semanas de edad, respectivamente.

10.- Vacuna frente a varicela (Var).- 2 dosis: la primera a los 12-15 m (preferentemente a los 12 meses) y la segunda a los 2-3 años de edad (preferentemente a los 2 años). En pacientes susceptibles fuera de las anteriores edades, vacunación con 2 dosis con un intervalo entre ellas de, al menos, un mes.

11.- Vacuna antigripal (Gripe).- Vacunación anual de pacientes con factores de riesgo para gripe y sus convivientes (mayores de 6 años); 1 dosis en mayores de 9 años; entre 6 m y 9 años se administrarán 2 dosis la primera vez con un intervalo de un mes y en los años siguientes, si persiste el factor de riesgo, vacunación anual con 1 dosis.

12.- Vacuna antihepatitis A (HA).- 2 dosis con un intervalo de 6-12 m a partir de los 12 m de edad. Vacunación de pacientes con indicación por viajes internacionales a países con endemicidad intermedia o alta, o por pertenecer a grupos de riesgo.

Aviso a pacientes y familiares

La información recogida en esta página web está dirigida, únicamente, a profesionales sanitarios de la atención primaria. No deberá utilizar su información para diagnosticar o tratar ninguna enfermedad o problema de salud. Si presenta o duda sobre existencia de un problema de salud deberá contrastar esta información con su médico de cabecera.