

## **PRUEBAS A REALIZAR EN EL ESTUDIO DE LA TROMBOFILIA**

Actualizado julio 2011

*Tiempo de protrombina, INR.*

*Tiempo de tromboplastina parcial activado*

*Fibrinógeno*

*Dímero D*

*Estudio de anticuerpos antifosfolípido (Anticoagulante lúdico, anticardiolipina)*

*Antitrombina III*

*Proteína C*

*Proteína S (total y libre)*

*Resistencia a la proteína C activada*

*Homocisteína*

*Factor V de Leiden*

*Mutación de la protrombina G20210A*

En los pacientes con historia antigua de trombosis venosa se puede realizar los estudios de hipercoagulabilidad, si esta sin tratamiento anticoagulante y deberá realizarse 2 meses después de la aparición de la trombosis para evitar artefactos por los reactantes de fase aguda.

Modificado de Nieto V, Hernando Y. Estados de hipercoagulabilidad. AMF 2011.

### **Aviso a pacientes y familiares**

La información recogida en esta página web está dirigida, únicamente, a profesionales sanitarios de la atención primaria. No deberá utilizar su información para diagnosticar o tratar ninguna enfermedad o problema de salud. Si presenta o duda sobre existencia de un problema de salud deberá contrastar esta información con su médico de cabecera.