

DIABETES. CONTRAINDICACIÓN DE LOS ANTIDIABÉTICOS ORALES SEGÚN PATOLOGÍA

Actualizada en febrero de 2012

| CONTRAINDICACIÓN DE LOS ANTIDIABÉTICOS ORALES SEGÚN PATOLOGÍA | |
|--|---|
| <u>PATOLOGÍA</u> | <u>FARMACOS CONTRAINDICADOS</u> |
| <u>INSUFICIENCIA RENAL</u> | |
| LEVE (SI EL FG < 60 ML/MIN) | NO USAR: METFORMINA |
| MODERADA (SI EL FG < 50 ML/MIN) | NO USAR: METFORMINA SITAGLIPTINA (iDPP4) Restricción en el uso de VIDAGLIPTINA (iDPP4) a dosis máxima de 50 mg/día |
| GRAVE (SI FG < 30 ML/MIN) | NO USAR: METFORMINA MIGLITOL SITAGLIPTINA (iDPP4) SUFOLNIUREAS, ACARBOSA EXENATIDE Restricción en el uso de VIDAGLIPTINA (iDPP4) a dosis máxima de 50 mg/día |
| <u>INSUFICIENCIA CARDIACA</u> | NO USAR: METFORMINA PIOGLITAZONA |
| <u>INSUFICIENCIA HEPÁTICA GRAVE</u> | NO USAR: METFORMINA, SULFONILUREA, GLINIDAS, PIOGLITAZONA, INHIBIDORES DE LAS ALFA-GLUCOSIDASAS, VIDAGLIPTINA (iDPP4) |
| <u>INSUFICIENCIA RESPIRATORIA</u> | NO USAR: METFORMINA |
| <u>ENFERMEDAD INTESTINAL</u> | NO USAR: INHIBIDORES DE LAS ALFA-GLUCOSIDASAS AGONISTAS DE LA GLP-1 |
| <u>ALCOHOLISMO</u> | NO USAR: METFORMINA |
| <u>CONTRASTE YODADOS</u> | NO USAR: METFORMINA |
| <u>ALERGIA A LA SULFAMIDA</u> | NO USAR: SULFONILUREAS |

BIBLIOGRAFIA: Documento de Consenso. Recomendaciones para el tratamiento farmacológico de la hiperglucemia en la diabetes tipos 2. Diabetes. Av Diabetol. 2010; 26: 331-8. AACE/ACE Consensus Panel on Type 2 Diabetes Mellitus: An Algorithm for Glycemic Control. Endocr Pract 2009; 15 (6): 541-558. www.vademecum.es

Aviso a pacientes y familiares

La información recogida en esta página web está dirigida, únicamente, a profesionales sanitarios de la atención primaria. No deberá utilizar su información para diagnosticar o tratar ninguna enfermedad o problema de salud. Si presenta o duda sobre existencia de un problema de salud deberá contrastar esta información con su médico de cabecera.