

PERICARDITIS. TRATAMIENTO

EPISODIO AGUDO

REPOSO

ANTIINFLAMATORIOS por su efecto analgésico, antipirético y antiinflamatorio. Debido a las dosis elevadas que utilizamos es recomendable utilizar protección gástrica.

De primera elección:

Acido acetilsalicílico (AAS).

- 1 gramos cada 6 horas durante la primera semana
- 1 gramo cada 8 horas la segunda semana
- 1 gramo cada 12 horas la tercera semana
- 1 gramo al día la cuarta semana

En caso de alergia o intolerancia:

Indometacina 75-200 mg/día.

Evitar en ancianos, porque disminuye el flujo coronario

Ibuprofeno de 400 a 800 mg/ 8 horas.

Con efecto beneficioso sobre la circulación coronaria.

Paracetamol 1 gramo cada 6 ó 12 horas

Otros fármacos:

Colchicina, 0,5mg/ 12 horas. Como monoterapia o asociada aines.

EN RECIDIVAS:

Restricción del ejercicio

Aspirina 1 gramo/día asociada a **Colchicina** 1 mg/día durante 1 año

Aviso a pacientes y familiares

La información recogida en esta página web está dirigida, únicamente, a profesionales sanitarios de la atención primaria. No deberá utilizar su información para diagnosticar o tratar ninguna enfermedad o problema de salud. Si presenta o duda sobre existencia de un problema de salud deberá contrastar esta información con su médico de cabecera