

## LA PREVENCIÓN EL CÁNCER DE CERVIX.

*¿Qué pruebas de cribado de cáncer de cérvix son las más adecuadas desde la Atención Primaria?*

*Para la prevención del cáncer de cérvix estaría bien indicado el test de Papanicolaou y el test de detección del VPH.*

*Según la SEGO, el test de Papanicolaou (citología) se debe de:*

*Iniciar a los 25 años,*

*Repetir cada 3-5 años hasta los 65 años.*

*Evitar realizarlo en mujeres con histerectomía.*

*Añadir la prueba de detección de VPH a todas las mujeres mayores de 30 años mejora la sensibilidad junto la citología del diagnóstico hasta casi el 100% y da la opción al facultativo de aumentar el intervalo entre citologías hasta 3 a 5 años.*

*¿Vacunar frente al virus del papiloma humano (VPH)?*

*Se recomienda administrar la vacuna contra el VPH a niñas de 11 a 12 años de edad (también se puede administrara a niñas entre 9 a 10 años). También se recomienda para las niñas y mujeres entre 13 y 26 años que no hayan todavía recibido la vacuna o completado todas las dosis de la vacuna.*

*Actualmente, todas la Comunidades Autónomas están vacunando contra el VPH.*

*Se han reforzar los programas de cribado del cáncer de cérvix.*

### ***Aviso a pacientes y familiares***

La información recogida en esta página web está dirigida, únicamente, a profesionales sanitarios de la atención primaria. No deberá utilizar su información para diagnosticar o tratar ninguna enfermedad o problema de salud. Si presenta o duda sobre existencia de un problema de salud deberá contrastar esta información con su médico de cabecera.