

TRATAMIENTO ANTIVIRAL DEL HERPES ZOSTER

MEDICACIÓN	DOSIS	ACCIÓN	EFFECTOS SECUNDARIOS
Pacientes inmunocompetentes			
ACICLOVIR	800 mg oral 5 veces al día durante 7-10 días	Acorta el tiempo de aparición de vesículas nuevas, favorece la formación de costra, cesa la extensión viral, reduce la severidad del dolor agudo.	Malestar general
FAMCICLOVIR Famvir®	500 mg oral 3 veces al día durante 7 días		Nauseas, cefalea
VALACICLOVIR Valtrex®	1 gramo oral 3 veces al día durante 7 días		
BRIVUDINA Nervinex®	125 mg oral una vez al día durante 7 días	Acorta el tiempo de aparición de vesículas nuevas, favorece la formación de costra, reduce la severidad del dolor agudo. No precisa ajustes por enfermedad renal	Nauseas, cefaleas. Contraindicadas en pacientes tratados con Fluoracilo u otras fluoropirimidinas
Pacientes inmunocomprometidos que precisan hospitalizaciones neurológicas severas			
ACICLOVIR	10 mg/kg intravenoso cada 8 horas durante 7-10 días	Acorta el tiempo de aparición de vesículas nuevas, favorece la formación de costra, cesa la extensión viral, reduce la diseminación cutánea, reduce el herpes zoster visceral.	Insuficiencia renal
FOSCARNET Foscavir® (para los resistentes al Aciclovir)	40 mg/kg intravenosos cada 8 horas hasta que las lesiones curen	No referidos	Insuficiencia renal, Hipopotasemia, hipocalcemia, hipomagnesemia, hipofosfatemia, nauseas, diarrea, vómitos, anemia, granulocitopenia, dolor de cabeza

Adaptado de Cohen JI. Herpes Zoster. N Engl J Med. 2013;369:3.